

修正動物用藥品使用準則第三條附件一

水產動物用藥品使用規範

一、品目：

- (一) 安默西林 Amoxicillin
- (二) 安比西林 Ampicillin
- (三) 脫氧羧四環黴素 Doxycycline
- (四) 紅黴素 Erythromycin
- (五) 氟甲磺氣黴素 Florfenicol
- (六) 氟滅菌 Flumequine
- (七) 北里黴素 Kitasamycin
- (八) 林可黴素 Lincomycin
- (九) 歐索林酸 Oxolinic acid
- (十) 羧四環黴素 Oxytetracycline
- (十一) 史黴素 Spiramycin
- (十二) 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine
- (十三) 磺胺一甲氧嘧啶 Sulfamonomethoxine
- (十四) 甲磺氣黴素 Thiamphenicol
- (十五) 三氯仿 Trichlorfon

二、本規範指定之對象水產動物為吳郭魚、鯉魚、鯽魚、草魚、大頭鱧、鰻魚、淡水鯰、鱸魚、虹鱔、香魚、虱目魚、嘉鱾、赤鯨、黑鯛、黃鰭鯛、黃錫鯛、鱸、海鱷、紅甘鯪、青甘鯪、烏魚、草蝦、班節蝦、長腳大蝦、蛙及鱉等二十六種。

三、本規範所指之投藥途徑，「經口」係將指定之藥品，添加、混和或浸潤於水產飼料中或以其他方式經口投藥。「藥浴」係將指定之藥品，添加於養殖池或容器內之水中，以浸泡投藥。

四、本規範所指之投藥劑量，經口投藥者均以魚之體重為單位，以藥浴投藥者均以水量為單位。抗生素之劑量均以力價表示。

五、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：

(一) 安默西林 Amoxicillin

化學名： α -Amino-p-hydroxybenzylpenicillin

性 狀：白色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。本劑之理化性狀及藥理學特性，極近似安比西林。通常使用其三水合物（trihydrate）。

作 用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，魚病上主要使用於鏈球菌或巴斯德桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用本劑偶會發生局部作用。

3.使用 Amoxicillin trihydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
鱸 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
虹 鱒	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
香 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
嘉 鱾	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
赤 鯨	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
黑 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
黃 鰭 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
黃 錫 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
鱸	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
海 鱺	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
紅 甘 鱈	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期

(日)

青甘鱈	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
-----	----	-------------------------	-------------------------	---

烏魚	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
----	----	-------------------------	-------------------------	---

(二) 安比西林 Ampicillin

化學名： α -Aminobenzylpenicillin

性 狀：白色乃至淡黃色結晶或結晶性粉末，稍溶於水，難溶於丙酮、甲醇、乙醇或氯仿，幾乎不溶於苯。在酸性溶液中相當安定，故可經口投藥。通常使用其三水合物。在水中不安定，故調配後立即投藥。

作 用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌及革蘭陰性菌具有抗菌作用，魚病上多用於鏈球菌或巴士德桿菌感染之治療，本劑受配尼西林酶之作用分解而失效。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用本劑偶會發生局部作用。

3.使用 Ampicillin trihydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
鱸 魚	經 口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
虹 鱒	經 口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
香 魚	經 口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
嘉 鱻	經 口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)

赤 鯨	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
黑 鯛	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
黃 鰭 鯛	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
黃 錫 鯛	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
繪	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
海 鱺	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
紅 甘 鱈	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)	
青 甘 鱈	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5
烏 魚	經	口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性鏈球菌或 巴斯德桿菌之感染	5

(三) 脫氧羥四環黴素 Doxycycline

化學名： α -6-Deoxy-5-hydroxytetracycline monohydrate

性 狀：為黃色至暗黃色結晶性粉末，無臭帶苦味。通常使用鹽酸鹽，鹽酸鹽易溶於水、甲醇，難溶於丙酮，不溶於乙醚、氯仿。乾燥狀態相當安定，水溶液於酸性安定，鹼性較不安定。

作 用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、陰性菌、螺旋體屬、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。
2.使用 Doxycycline hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
鱸 魚	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
嘉 鱻	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
赤 鯨	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
黑 鯛	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
黃 鰭 鯛	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	20
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期

					(日)
黃錫鯛	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
海鱧	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
紅甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
青甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20
烏魚	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	20

(四) 紅黴素 Erythromycin

化學名：Erythromycin A

性 狀：為鹼性物質。白色至淡黃白色結晶、結晶性粉末或粉末，無臭帶苦味。難溶於水，易溶於酒精、丙酮、氯仿、乙醚等。畜牧獸醫及水產上除基質外，多用硫氰酸鹽(Thiocyanate)及乙基琥珀酸鹽(Ethylsuccinate)。

作 用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、黴漿體、鈎端螺旋體、立克次氏體及大型病毒具有抗菌作用。魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。與其他巨環類抗生素之間有不完全的交叉抗藥性。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Erythromycin 或 Erythromycin thiocyanate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
鱸 魚	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
嘉 鱾	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
赤 鯨	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
黑 鯛	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
黃 鰭 鯛	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期

					(日)
黃錫鯛	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
鱸	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
紅甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
青甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
烏魚	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30

(五) 氟甲磺氯黴素 Florfenicol

化學名：2,2-dichloro-N-[(α S, β R)- α -(fluoromethyl)- β -hydroxy-P-(methylsulfonyl)-phenethyl] acetamide

性 狀：白色～淡黃色結晶性粉末或粉末，可溶於丙酮，稍溶於甲醇，不溶於水。

作 用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、鏈球菌或巴斯德桿菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Florfenicol。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳郭魚	經 口	10mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鏈球菌或巴斯德桿菌之感染。	5
鰻 魚	經 口	10mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或鰻敗血症假單胞菌之感染。	7
虹 鱒	經 口	10mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性弧菌或鮭屬產氣單胞菌之感染。	14
香 魚	經 口	10mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌	14

群或弧菌之感
染。

(六) 氟滅菌 Flumequine

化學名：6,7-dihydro-9-fluoro-5-methyl-1-oxo (1H, 5H)-benzo (i, j) quinolizine-2-carboxylic acid

性狀：白色微細結晶性粉末，無臭而帶有微苦，不溶於水，溶於氯仿及乙醇。

作用：對於革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於巴斯德桿菌、運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Flumequine。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
吳郭魚	經口	20mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性巴斯德桿菌或親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	8
鰻魚	經口	20mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	20

(七) 北里黴素 Kitasamycin

化學名：Kitasamycin

性狀：屬於巨環類抗生素，為鹼性白色乃至黃色、無臭、帶苦味結晶性粉末。通常使用基質或酒石酸鹽。基質易溶於甲醇、乙醇、丁醇、丙酮、氯仿、乙醚及苯，不溶於酸性水，微溶於水。酒石酸鹽易溶於水、乙醇、甲醇、丙酮，可溶於乙酸乙酯，微溶於氯仿、乙醚，難溶或不溶於石油醚、甲苯等。本劑相當安定。

作用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、鈎端螺旋體屬及黴漿體有抗菌作用，對革蘭陰性桿菌則無抗菌作用。與其他巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。魚病上主要使用於鏈球菌之感染。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Kitasamycin。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
吳郭魚	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
鱸魚	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
虹鱒	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
香魚	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
嘉鱲	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感	20

染。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
赤 鯨	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
黑 鯛	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
黃 鰭 鯛	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
黃 錫 鯛	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
鱸	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
海 鱺	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
紅 甘 鱈	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20
青 甘 鱈	經 口	80mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感	20

染。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
烏魚	經口	80mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑 具有感受性 鏈球菌之感 染。	20

(八) 林可黴素 Lincomycin

化學名：Methyl 6,8-dideoxy-6 [[[1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl) carbonyl] amino]-1-thio-d-erythro- α -d-galac-to-octopyranoside.

性 狀：為鹽基性抗生素，通常以鹽酸鹽之一水合物供製劑用。鹽酸鹽為白色結晶性粉末，無臭帶苦味。易溶於水，可溶於甲醇及乙醇，微溶或不溶於低極性有機溶劑。乾燥狀態或水溶液均相當安定。

作 用：屬於中廣效性抗生素。對革蘭陽性菌有抗菌作用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。本劑與一部份巨環類抗生素間有不完全交叉抗藥性。

注意事項：1.本劑不可與紅黴素同時使用。

2.本劑不可連續使用7日以上。

3.使用 Lincomycin hydrochloride。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10
鱸 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10
嘉 鱾	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10
赤 鯨	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10
黑 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10
黃 鰭 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	10

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
黃 錫 鯛	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	10
鱸	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	10
紅 甘 鱈	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	10
青 甘 鱈	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	10
烏 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具 有感受性鏈球 菌之感染。	10

(九) 歐索林酸 Oxolinic acid

化學名：5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo [4,5-g] quinoline-7-carboxylic acid

性 狀：白色至帶白色柱狀結晶或結晶性粉末，無味，無臭。易溶於蟻酸，可溶於鹼性水，幾乎不溶於水及其他有機溶劑。

作 用：對革蘭陰性菌有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌、弧菌或巴斯德桿菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Oxolinic acid 或 Sodium oxolate monohydrate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或巴斯德桿菌之感染。	16
鯉 魚	經 口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鯽 魚	經 口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
草魚	經口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
大頭鱧	經口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
鰻魚	經口 藥浴	20mg/kg/日， 連續投藥3~5日。 5 ppm，連續藥 浴3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或鰻敗血症假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	25
淡水鱖	經口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	16
虹鱒	經口	20mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性鮭屬產氣單胞菌或	21

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
香魚	經口 藥浴	20mg/kg/日， 連續投藥3~5日。 10 ppm，連續藥 浴3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	14
虱目魚	經口	20mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	14
草蝦	經口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
斑節蝦	經口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
長腳大蝦	經口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
蛙	經口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌或產黃色素菌屬之感染。	16

鰲	經口	30mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	16
---	----	-------------------------	-----------------------------------	----

(十) 羥四環黴素 Oxytetracycline

化學名：4-(dimethylamino)-1,4,4 α ,5,5 α ,6,11,12 α -octahydro-3,5,6,10,12,12 α -hexahydroxy-6-methyl-1,11,dioxo-2-naphthacene carboxamide

性狀：為兩性物質，易與陽離子及陰離子結合形成鹽類。以鹽酸鹽，基質及鈣鹽供為製造製劑的原料。基質為金黃色結晶，易溶於酸及鹼，難溶於丙酮、乙醚、氯仿。鹽酸鹽亦為金黃色結晶、無臭、帶苦味，易溶於水、甲醇、乙醇、丙酮、丙二醇，可溶於丁醇，不溶於石油醚、乙醚及苯。易與金屬離子形成螯合物，影響腸道之吸收。魚病治療時通常使用鹽酸鹽。

作用：屬於廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、鈎端螺旋體屬、立克次體屬及大型病毒有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌或弧菌感染之治療。本劑與其他四環黴素類抗生素間有完全交叉抗藥性。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Oxytetracycline hydrochloride 或 Oxytetracycline quarternary salt。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
吳郭魚	經口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或法蘭西斯樣菌(劑量加倍)之感染。	20
鰻魚	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單	30

胞菌或或愛德
華氏菌之感染。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
鱸魚	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
虹鱒	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鮭屬產氣單胞菌或弧菌之感染。	30
虱目魚	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
黑鯛	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
黃鰭鯛	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
黃錫鯛	經口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之	30

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
鱸	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
烏 魚	經 口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30
草 蝦	經 口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
斑 節 蝦	經 口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
長腳大蝦	經 口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或假單胞菌或弧菌之感染。	30
蛙	經 口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌之感染。	30

驚	經	口	50mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具 有感受性親水 性產氣單胞菌 群或螢光假單 胞菌之感染。	30
---	---	---	-------------------------	--	----

(十一) 史黴素 Spiramycin

化學名：Spiramycin embonate

性狀：白色～淡黃色之結晶性粉末，味苦。極易溶於氯仿或甲醇，易溶於丙酮，難溶於水。

作用：屬於中廣效性抗生素。對於革蘭陽性菌具有抗菌性用，魚病上主要用於鏈球菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Spiramycin embonate。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
吳郭魚	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
鱸魚	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
嘉鱾	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
赤鯨	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
黑鯛	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
黃鰭鯛	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
黃錫鯛	經口	40mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
鱈	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
紅甘鮭	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
青甘鮭	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30
烏 魚	經 口	40mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有感受性鏈球菌之感染。	30

(十二) 磺胺二甲氧嘧啶或其鈉鹽 Sulfadimethoxine

化學名：N¹-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide

性狀：白色結晶性粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於甲醇、乙醇，極難溶於氯仿，幾乎不溶於水、乙醚、苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氨試液。

作用：本劑對革蘭陽性菌及陰性菌有抗菌作用。屬於長效性磺胺劑。魚病上主要用於弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Sulfadimethoxine 或 Sulfadimethoxine sodium。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
虹 鱒	經 口	100mg/kg/日， 連續投藥3~5日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30

(十三) 磺胺一甲氧嘧啶或其鈉鹽 Sulfamonomethoxine

化學名：N¹-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl) sulfanilamide or sodium salt

性 狀：白色至微黃色結晶，微粒或粉末，無臭。稍易溶於丙酮，難溶於乙醇，極難溶於乙醚或氯仿，幾乎不溶於水或苯。溶於稀鹽酸、氫氧化鈉試液或氫試液，遇光徐徐著色。藥浴時使用其鈉鹽。

作 用：對革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於運動性產氣單胞菌、愛德華氏菌或弧菌感染之治療。本劑與其他磺胺劑間有交叉抗藥性。本劑屬於長效性磺胺劑。

注意事項：1.本劑不可連續使用7日以上。

2.使用 Sulfamonomethoxine 或 Sulfamonomethoxine sodium。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	第一日 200mg / kg，翌日起改為半量，連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌或弧菌之感染。	15
鰻 魚	經 口	第一日 200mg / kg，翌日起改為半量，連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌之感染。	30
鱸 魚	經 口	200mg / kg / 日，連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感染。	30
虹 鱒	經 口	150mg / kg / 日，連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或弧菌之感染。	30
	藥 浴	在 1% 食鹽水加本劑 10 ppm。		15
香 魚	經 口	200mg / kg / 日，連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有感受性弧菌之感	30

染。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
嘉 鱻	經 口	200mg/kg/日， 連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
赤 鯨	經 口	200mg/kg/日， 連續投藥 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
黑 鯛	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
黃 鰭 鯛	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
黃 錫 鯛	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
鱈	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
紅 甘 鱈	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
青 甘 鱈	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性弧菌之感 染。	30
蛙	經 口	200mg/kg/日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性親水性產 氣單胞菌群或螢 光假單胞菌或弧	30

				菌之感染。	
鰲	經	口	200mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性親水性產 氣單胞菌群或螢 光假單胞菌或弧 菌之感染。	30

(十四) 甲磺氯黴素 Thiamphenicol

化學名：D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-P-(methylsulfonyl)phenethylacetamide

性 狀：白色結晶性粉末，略有苦味，具有吸濕性，但對光及熱則相當安定。室溫在水中溶解度為 0.5~1.0%，甲醇為 5%，Dimethylformaldehyde 及 Propylene glycol 的溶解度較高。

作 用：屬於廣效性抗生素，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌具有抗菌作用。魚病上主要用於巴斯德菌或弧菌感染之治療。

注意事項：1.本劑不可連續使用 7 日以上。

2.使用 Thiamphenicol。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
吳 郭 魚	經 口	20mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
嘉 鱲	經 口	50mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
赤 鯨	經 口	50mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
黑 鯛	經 口	50mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
黃 鰭 鯛	經 口	50mg / kg / 日， 連續使用 3~5 日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)

黃錫鯛	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
紅甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15
青甘鱈	經	口	50mg/kg/日， 連續使用3~5日。	治療對本劑具有 感受性巴斯德菌 或弧菌之感染。	15

(十五) 三氯仿 Trichlorfon

化學名：0,0-dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl phosphonate

性 狀：白色結晶粉末，微有氣味，微溶於水、乙醚、氯仿及乙醇。

作 用：低毒性廣效性殺蟲劑，魚病上主要用於體表或鰓之外寄生蟲。

注意事項：1.有些魚種或個體對本劑具敏感性，宜從較低濃度開始使用。

2.使用 Trichlorofon。

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)
鯉 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鯽 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
草 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
大 頭 鱧	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5
鰻 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等	5

			外寄生蟲。		
對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用 途	停藥期 (日)	
鱸 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
虱 目 魚	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
嘉 鱨	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
赤 鯨	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
黑 鯛	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
黃 鰭 鯛	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次連續投藥 4 週。	殺滅對本劑具有感受性寄生體表或鰓之原蟲類、單殖吸蟲類、甲殼蟲類等外寄生蟲。	5	
黃 錫 鯛	藥 浴	每次 0.2 ~ 0.5	殺滅對本劑具有感	5	

對象水產動物	投藥途徑	劑量或濃度及用法	用途	停藥期 (日)
		ppm，每週一次 連續投藥4週。	受性寄生體表或鰓 之原蟲類、單殖吸 蟲類、甲殼蟲類等 外寄生蟲。	
繪	藥浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次 連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感 受性寄生體表或鰓 之原蟲類、單殖吸 蟲類、甲殼蟲類等 外寄生蟲。	5
海 鱺	藥浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次 連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感 受性寄生體表或鰓 之原蟲類、單殖吸 蟲類、甲殼蟲類等 外寄生蟲。	5
烏 魚	藥浴	每次 0.2 ~ 0.5 ppm，每週一次 連續投藥4週。	殺滅對本劑具有感 受性寄生體表或鰓 之原蟲類、單殖吸 蟲類、甲殼蟲類等 外寄生蟲。	5