

寶寶接種疫苗全解析！



文字資料來源:台灣兒童感染症醫學會
國衛院兒童醫學及健康研究中心
圖片資料來源:網路圖片

疫苗有哪些種類？

- ◆非活性疫苗---只含病原的部分抗原或已經被去除活性的病原，目前上市使用的非活性疫苗包括A型肝炎疫苗、型肝炎疫苗、白喉類毒素、破傷風類毒素、百日咳疫苗、b型嗜血桿菌疫苗、注射小兒麻痺疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗、腦膜炎球菌疫苗、狂犬病疫苗。
- ◆活性減毒疫苗---含有毒性減弱的病原，目前上市使用的活性減毒疫苗包括卡介苗、麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、德國麻疹、水痘、帶狀疱疹、日本腦炎活性減毒疫苗、口服輪狀病毒。



什麼時候不可以接種疫苗？

- ◆ 接種同種疫苗曾經發生過敏性休克等嚴重反應時，不應再度注射該種疫苗。
- ◆ 免疫功能缺損、嚴重營養不良、懷孕時不應接種活性減毒疫苗。
- ◆ 有發燒等急性疾病時，可延後疫苗接種。
有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀已有一段時間、正接受抗生素治療、感染症的恢復期，都可以接種疫苗。




疫苗注射應該注意什麼?(1)

- ◆ 注射疫苗時應坐(躺)著接種，注射後宜在接種單位觀察至少30分鐘，以即時處理立即性過敏反應。
- ◆ 疫苗注射後，不必特意去揉注射部位。
- ◆ 疫苗注射後可以正常作息，包括洗澡。



疫苗注射應該注意什麼?(2)

- ◆ 目前在台灣上市使用的疫苗都可以同時接種在不同部位，同時接種的疫苗數目並沒有上限；活性減毒疫苗可以同時接種在不同部位，如果不能同時接種時，活性減毒疫苗之間應至少間隔28天。



疫苗接種後的反應該怎麼處理?(1)

- ◆常見的注射部位紅腫反應在數天之內會慢慢恢復，**不可以熱敷，冰敷則稍有止痛效果**，但不會減少紅腫消退的時間。
- ◆有些疫苗的局部紅腫直徑偶會超過10公分，這是強烈免疫反應的現象，並不影響身體健康。
- ◆幼兒疫苗接種於大腿外側時，有時因為疼痛而不敢移動腿部，1~2天後會逐漸恢復，有必要時，可給予止痛藥。



疫苗接種後的反應該怎麼處理?(2)

- ◆局部紅腫反應如果超過2~3天還逐漸擴大，應由兒科醫師診視是否有感染跡象。
- ◆疫苗引起的發燒反應，有必要時可以給予退燒藥，大多發生在接種後24小時內，一般不會持續超過24小時，太晚發燒或持續太久，應由兒科醫師診視是否有其他疾病。



疫苗接種後的反應該怎麼處理?(3)

- ◆對於容易引起發燒的疫苗，有專家建議可以在接種疫苗前後使用預防性退燒藥，但有研究發現預防性退燒藥可能稍微會降低疫苗的免疫效果。
- ◆有時3~5歲以下兒童發燒會引起熱痙攣，通常持續不超過15~20分鐘，宜至兒科急診確認有無其他病因。

熱痙攣發作時意識不清、四肢抽搐、牙關緊閉、眼睛上吊、嘴唇發紫、口鼻分泌物增加



疫苗接種後的反應該怎麼處理?(4)

- ◆疫苗接種後常出現進食減少現象，應注意補充水分以免脫水。
- ◆疫苗通常不會引起明顯咳嗽、流鼻水、腹瀉等症狀，如果出現這些症狀，宜由兒科醫師診治。
- ◆疫苗接種後如果出現疑似疫苗相關嚴重不良反應，可以通報衛生局，由預防接種傷害救濟委員會釐清相關性。

